



#### Á MEÐAN ENDURLÍFGUN ER Í GANGI

- Tryggja gott hnoð
- Hafa sem minnst rof á hnoði
- Gefa súrefni
- Nota koltvísýringsnema
- Stöðugt hjartahnoð þegar búið er að tryggja öndunarveginn
- Æðaaðgengi (æðaleggur eða beinmergsnál)
- Gefa adrenalín á 3 - 5 mínútna fresti
- Gefa amiodarone eftir þriðja stuð

#### MEÐHÖNDLA ORSAKIR

- Hypoxia (súrefnisskortur)
- Hypovolemia (of lítið blóðrúmmál)
- Hypo-/hyperkalaemia/metabolic (kalíumofgnótt/brestur/efnaskiptatruflanir)
- Hypothermia/hyperthermia (ofkæling / ofhitnun)
- Thrombosis – coronary or pulmonary (blóðsegarek)
- Tension pneumothorax (þrýstingsloftbrjóst)
- Tamponade cardiac (gollurshússvökvi)
- Toxins (eitranir)

#### ÍHUGA

- Ómskoðun
- Notkun hjartahnoðstækis (mechanical compression) til að auðvelda flutning / meðferð
- Hjartaþræðingu
- Hjarta- og lungnavél