

HRAÐTAKTUR FULLORÐINNA FLÆÐIRIT*

Meta með ABCDE nálgun

- Fylgjast með SpO₂, sírita, BP
- Gefa súrefni ef SpO₂ <94%
- Tryggja æðaaðgengi
- Taka 12-leiðslu EKG
- Greina og meðhöndla afturkræfar orsakir

Lífshótandi einkenni?

- Lost
- Yfirlíð með alvarlegum/viðvarandi lágþrýstingi
- Blóðþurrð í hjarta
- Alvarleg hjartabilun með lungnabjúg eða losti
- Eða strax eftir ROSC


ÁSTAND ÓSTÖÐUGT

Rafvending

- Allt að 3 tilraunir
- Slæving / svæfing ef meðvitund

Án árangurs

- Amiodarone 300 mg í æð á 10-20 mín.
- Endurtaka rafvendingu



*Þetta flæðirit er fyrir hraðtakt með púls af óeðlilegum uppruna. Það er ekki ætlað fyrir sínushraðtakt þar sem meðhöndla ætti undirliggjandi orsök - ekki reyna að hægja á sínushraðtaki með lyfjum við hjartsláttartruflunum eða með rafvendingu. Leita skal aðstoðar sérfræðings ef hraðtakturinn heldur áfram og/eða ef lífshættuleg einkenni koma fram.